



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 32 du 13 octobre 1999 - 2 pages Numéro ordre postal : 66

Colza

STADES : 2 à 10 feuilles.

Tenthredes

Quelques captures d'adultes ont encore été enregistrées depuis la semaine dernière sur quelques sites de Seine et Marne. Des chenilles sont toujours présentes dans certaines parcelles, ainsi que quelques teignes, qui provoquent des défoliations moins importantes.

Altises

Le vol, jusqu'alors nul à faible, a repris la semaine dernière dans la moitié des pièges de la région. Cela devrait se confirmer avec les belles journées actuelles. Une surveillance des morsures peut être envisagée sur les parcelles très en retard.

Charançon du bourgeon terminal

Le vol a débuté dans quelques secteurs (voir carte) : sud Essonne, Vert le grand (91), Chaumes en Brie et Chambry (77). Les captures devraient se généraliser si les conditions ensoleillées se maintiennent. Ce ravageur est peu ou pas piégé depuis 3 ans dans le Val d'Oise et les Yvelines.

Le charançon pond dans les pétioles et les larves peuvent détruire le bourgeon terminal. Il y a alors développement de ramifications secondaires, donnant un aspect buissonnant et une moindre productivité.

La lutte repose sur un traitement insecticide **8-10 jours après le début du vol**, pour viser une destruction maximale d'adultes avant leur entrée en ponte.

Pucerons

Les infestations se développent surtout dans l'Essonne et le sud Seine et Marne. Les pucerons verts sont les plus fréquents. On trouve parfois des pucerons cendrés (moins nuisibles potentiellement) par exemple à Episy (77), Janvry (91)...

Si la fréquence de pieds touchés dépasse souvent le seuil d'intervention de 20% de

pieds touchés, les populations ne sont pas encore très importantes. A surveiller.

Si la pression puceron reste modérée, il peut être envisagé de retarder l'intervention pour viser aussi le charançon. Une simple pyrèthrine constitue un compromis pour lutter à la fois contre les charançons, les altises et les pucerons. Toutefois si les populations de pucerons sont importantes, une pyrèthrine seule est parfois insuffisante (efficacité irrégulière, problèmes possibles de résistance), et on conseille plutôt une pyrèthre associée (à un carbamate ou un organophosphoré) ou un aphicide spécifique.

Phoma

Des taches sont visibles sur plusieurs variétés : PRONTO (Episy-77, Château Landon-77, Chaumes en Brie-77, Villeneuve Saint Martin-95..), BRISTOL (Vert le grand-91), MOHICAN (Amponville-77), CAPITOL (Chalet en Brie-77, Les Granges le roi-91..) CANARY (Gometz la ville-91) ZERUKA (Maissoncelles en Brie-77).

Pas de projections de spores relevées dans nos pièges depuis la semaine dernière. Au delà du stade 6-8 feuilles, le risque est moindre.

Céréales

Ravageurs

- attention aux limaces,
- surveiller les pucerons et les cicadelles sur les parcelles déjà levées et non protégées GAUCHO si les conditions ensoleillées se maintiennent.



Colza
Activité des ravageurs.

768

Service Régional de la
Protection des
Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48


Imprimé à la station
D'Avertissements
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
J. BOULUD

Publication périodique
C.P.P.A.P.
n°0904 B 00536
ISSN n°0767-5542

Tarif Courrier 350 F
Fax 430 F

3405 48744

Fréquence de pucerons au 12/10



Captures de charançons au 11/10



Captures cumulées d'altises au 12/10

